

# Vegetación



## Localización



## Datos cartográficos

Huso 28  
Elipsoide GRS80 (WGS84)  
Proyección UTM Datum REGCAN95

Escala 1:25,000

500 0 500 1.000 1.500  
Metros



Las altitudes refieren al nivel medio del mar en las Islas Canarias  
Equidistancia de las curvas de nivel 25 m

Cartografía base: GRAFCAN (2002)  
Fuente: Wolfredo Wildpret de la Torre y Victoria E. Martín Osorio (2004, inéd)



## Simbología utilizada

- Comunidades vegetales**
- Zonas no colonizadas o vegetación incipiente**
  - Áreas rocosas o marginales sin colonizar
  - Áreas cubiertas de piróclastos sin colonizar
  - Coladas y piróclastos con cubierta vegetal dispersa
  - Áreas degradadas sin cubierta vegetal
- Spartocytisium supranubii (Retamares)**
  - Retamares típicos
  - Subasociación echinopsium wilgense (Retamares con tajinaste rojo)
  - Subasociación descurainarum bourgaeanae (Retamares con papavera)
  - Facies con Argemone tenerifensis (Retamares con Margarita del Teide)
  - Facies con Adenocarpus viscosus (Retamares con codones)
  - Retamares pluri específicos de floración compleja
  - Retamares degradados
- Sideritido solutae-Pinetum canariensis (Pinares)**
  - Pinares típicos
  - Subasociación adenocarpaeum viscosi (Pinares típicos con codones)
  - Subasociación spartocytisium supranubii (Pinares orofitos)
  - Subasociación spartocytisium supranubii facies con Adenocarpus viscosus (Pinares orofitos con codones)
  - Subasociación spartocytisium supranubii facies empobrecidas (Pinares orofitos empobrecidos)
- Otras comunidades**
  - Vulpio myuri-Lophanthemum taydei (Vegetación de fumarolas)
  - Mentha-Carlotum caldarae facies con Salix canariensis (Comunidades higrofitas)
  - Echinium suberitum (Comunidades de tajinaste azul)
- Erysimo scoparii-Pterocarpalum lasiospermi (Matorrales seriales de rosalillo y alheli)**
  - Situaciones típicas
  - Facies con Pterocarpalum caldarae (Situaciones con perez de sombra)
  - Facies con Carthagenanthemoides (Situaciones con malpelo)
  - Facies con Adenocarpus viscosus (Situaciones con codones)
  - Facies con Chenopodium taydei (Situaciones con cabazon)
  - Facies pluri específicas (Situaciones de floración compleja)
- Arrhanathero caldarae-Plantaginum webbii (Cerrillal-crespal)**
  - Situaciones típicas
  - Facies con Cynodon sarranthenoides (Situaciones con malpelo)
- Chellantho-Aeonietum smithii, Greenovietum aureae, Greenovietum alzoi (Vegetación rupícola)**
  - Situaciones típicas
  - Situaciones mixtas de retamar y comunidades rupícolas
  - Situaciones indiferenciadas
- Violetum cheiranthifoliae (Comunidades de violeta del Teide)**
  - Violetares típicos
  - Situaciones mixtas con Echium suberitum (Violetares con tajinaste azul)
  - Situaciones mixtas con Vulpio-laphangium (Violetares y vegetación de fumarolas)
  - Facies con Sternanthera cyanoides (Violetares con cardo de plata)
  - Facies con Silene noctastensis (Violetares con conegra)